

COVID-19 Quand se faire tester ?

Toute personne présentant une suspicion de COVID-19 doit se faire immédiatement tester, même si elle est (complètement) vaccinée, et s'isoler en attendant le résultat du test. Il y a suspicion de COVID-19 dès qu'on observe :

au moins un des symptômes majeurs suivants d'apparition aiguë, sans autre cause évidente

OU

au moins deux des symptômes mineurs suivants, sans autre cause évidente


Symptômes principaux 1 symptôme = suspect



TOUX (SÈCHE)



ESSOUFFLEMENT



PERTE DU GOÛT
ET DE L'ODORAT



DOULEURS À
LA POITRINE

Symptômes secondaires 2 symptômes = suspect



FIÈVRE



MAUX DE TÊTE



MAUX DE GORGE



FATIGUE



RHUME
(NEZ BOUCHÉ,
ÉCOULEMENT NASAL)



DOULEURS
MUSCULAIRES
(COURBATURES)



PERTE
D'APPÉTIT



CONFUSION AIGUË
ET CHUTE SOUDAINE
(CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES)



DIARRHÉE
ACQUEUSE

OU une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (BPCO, asthme, toux chronique...), sans autre cause évidente.

Vous observez un ou deux de ces symptômes ?

Remplissez immédiatement le questionnaire du gouvernement via www.masante.belgique.be. S'il existe des symptômes multiples et/ou spécifiques de COVID-19, un code de test est créé. Ce code de test peut être utilisé pour :

- **TEST RAPIDE** : à réaliser en pharmacie en cas de symptômes depuis ≤ 5 jours.
- **TEST PCR** : à réaliser dans un centre de test, résultat seulement après quelques heures/jours.

Un **AUTOTEST** peut aussi être réalisé sans code test en cas de symptômes, mais la qualité de l'autotest est inférieure à celle d'un test rapide ou d'un test PCR :

- Un autotest négatif peut être un « faux négatif » et on peut alors être tout de même contagieux.
- Un autotest positif doit toujours être confirmé par un test rapide (en pharmacie) ou un test PCR (en centre de test).

Plus d'infos, www.info-coronavirus.be
www.cohezio.be

cohezio

Service Externe de Prévention
et de Protection au Travail